



ORARI PRELIEVI

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ dalle **7.00** alle **10.00** su **prenotazione**

VIA DELLE COLONIE, 3 | 30028 BIBIONE (VE)

T **0431 441757** | F 0431 441760

www.bibioneterme.it | edical@bibioneterme.it



IL TUO NUOVO PUNTO PRELIEVI
a Bibione

Il tuo nuovo punto prelievi a BIBIONE

Bibione Thermae e Centro di medicina insieme per il nuovissimo Punto Prelievi che garantisce la massima efficienza e sicurezza grazie a personale qualificato e apparecchiature all'avanguardia. Puoi richiedere esami di laboratorio di routine o di alta specializzazione.



COMODO

Il punto prelievi più vicino a casa tua
aperto martedì e mercoledì
su prenotazione



RAPIDO

Con prenotazione o senza, i tempi di
attesa sono brevissimi



CONVENIENTE

Chiedi il tuo preventivo gratuito



REFERTI ONLINE

Puoi scaricarli dal sito
centrodimedicina.com



CHECK UP PREVENZIONE



CARDIOLOGICO

Per la prevenzione e la diagnosi delle patologie del cuore.



EPATICO

Per la diagnosi e la prevenzione delle patologie del fegato.



METABOLISMO LIPIDICO

Monitoraggio delle patologie vascolari su base aterosclerotica.



Emocromo con formula

Colesterolo Totale, LDL e HDL

Gamma-gt

Glicemia

PT/PTT

Omocisteina

Apolipoproteina A e B

Creatinina

Creatin Fosfo Chinasi (CPK)

Transaminasi (AST/ALT)

Trigliceridi

Fibrinogeno

Bilirubina totale e frazionata

Virus epatite B (aHBs e HBsAg)

Virus epatite C (HCV)

Uricemia

Esame urine completo

INTOLLERANZE ALIMENTARI

Dosaggio IgG4 specifiche, su una base amplissima di alimenti, definito tra specialista, paziente e medico di laboratorio.

ALLERGOLOGICO RAST TEST

Dosaggio IgE specifiche, su una base amplissima di RAST test, definito tra specialista, paziente e medico di laboratorio.

CHECK UP OSTEOPOROSI



CONTROLLO

RISPOSTA TERAPEUTICA



CONTROLLO PERIODICO



APPROFONDIMENTO
COMPLETO



Calcio e Fosforo

Creatinina

Crosslaps (oppure CTX)

Proteine totali

Fosfatasi alcalina

Emocromo con formula

25 (OH) vitamina D3

Elettroforesi

Proteina C reattiva

Calcio e Fosforo (urine 24h)

Esame urine completo

CHECK UP SALUTE

BASE

Controllo dello stato di benessere della persona.



AVANZATO

Controllo della funzionalità epatica, renale, emopoietica e coagulativa.



ESTESO

Controllo della funzionalità epatica, renale, emopoietica e coagulativa in un'ottica di prevenzione clinica.



●	●	●	Emocromo con formula
●	●	●	Glicemia
●	●	●	Trigliceridi
●	●	●	Colesterolo Totale e HDL
●	●	●	Velocità di Eritrosedimentazione (VES)
●	●	●	Creatinina
●	●	●	Transaminasi (AST /ALT)
●	●	●	Bilirubina totale e frazionata
●	●	●	Esame urine completo
●	●	●	Gamma-gt
●	●	●	PT/PTT
●	●	●	PSA totale (solo per gli uomini)
●	●	●	TSH (solo per le donne)
●	●	●	Elettroforesi delle siero proteine
●	●	●	Ferritina
●	●	●	Uricemia
●	●	●	Sangue Occulto (1 campione)

Per salvaguardare l'ambiente, non gettate questo biglietto a terra - I prezzi possono subire variazioni. Rev.00/2016 - Stampato nel mese di MAGGIO 2016.

Richiedi i nostri pacchetti di esami



A tua disposizione i check up salute: pacchetti di analisi ed esami mirati per verificare il tuo stato di salute generale e per specifiche patologie. Una soluzione studiata per il tuo risparmio, non solo in termini di tempo

ESAMI SPECIFICI

BREATH TEST HP helicobacter pilori PER L'INDIVIDUAZIONE DI PATOLOGIE GASTRODUODENALI SUPPORTATE DA TALE BATTERIO.

- Digiuno dalla mezzanotte precedente il prelievo (anche di acqua).
- Il test viene eseguito dopo almeno 10 giorni dal termine della terapia con antibiotici o farmaci (quali gastroprotettori, antiacidi, ...), dall'uso di lassativi o fermenti lattici e da gastrolavaggio intestinale o enteroscopia.

BREATH TEST AB H2-LATTOSIO

INDIVIDUA LA CARENZA DELL'ENZIMA LATTASI.

- Il giorno precedente il test, evitare l'assunzione di frutta, verdura, pane, pasta, caramelle, chewing-gum e alcolici.
- La sera precedente si raccomanda una cena leggera.
- Digiuno da un minimo di 10 ore.
- È possibile bere solo acqua non gasata.
- Non fumare, né dormire, né fare esercizio intenso per almeno mezz'ora prima e durante il test.
- Informare il medico se di recente si è eseguita una terapia antibiotica o si ha avuto episodi di diarrea; questo può avere conseguenze sul risultato del test.
- Non assumere farmaci fin dalla sera precedente.
- Il test deve essere eseguito almeno 4 settimane dopo la terapia con antibiotici, lavaggio intestinale o enteroscopia e, almeno 1 settimana dopo la sospensione dell'uso di lassativi o fermenti lattici.